



What is an opioid overdose?

An opioid overdose can slow or stop breathing and can be life-threatening within minutes. Fentanyl is a very strong opioid and may be hidden in counterfeit pills or street drugs. Naloxone can reverse an opioid overdose temporarily - emergency help is still needed.

Overdose Warning Signs



Slow or no breathing

Breathing is very slow, weak, gasping, or stopped.




Cannot wake up

Very sleepy, limp, or not responding to voice/touch.



Pinpoint pupils

Very small pupils can be a sign of opioid overdose.



Blue/gray lips

Lips, nails, or skin look blue, gray, or cold.



Possible fentanyl

Risk with fake pills, heroin, cocaine, meth, or unknown drugs.



Call 911

Naloxone is temporary. The person still needs emergency care.



Gurgling sounds

Choking, snoring, or gurgling sounds can mean blocked breathing.



Cold clammy skin

Skin may feel cold, sweaty, or clammy.

What Should You Do?



GREEN - Prepare & Prevent

Carry naloxone. Do not use alone. Avoid unknown pills. Talk to a doctor or treatment program.



YELLOW - Possible Overdose

If unsure, treat it like an overdose. Give naloxone if available and call 911.



RED - Call 911 Now

No/slow breathing, blue lips, cannot wake up, or collapse. Give naloxone, place on side, stay.

Higher Risk:

People using opioids, counterfeit pills, mixed drugs, alcohol/benzodiazepines, or returning after a break/treatment/jail.



SCAN FOR VIDEOS

Say: "Possible opioid overdose. Naloxone given."
SAMHSA: 1-800-662-HELP

Need Help? Call 911 for emergencies. For local referrals, dial 2-1-1.

For educational purposes only. Always consult a healthcare professional.



¿Qué es una sobredosis de opioides?

Una sobredosis de opioides puede hacer que la respiración sea lenta o se detenga y puede ser mortal en minutos. El fentanilo es un opioide muy fuerte y puede estar en pastillas falsas o drogas de la calle. La naloxona puede revertir una sobredosis temporalmente - aún se necesita ayuda de emergencia.

Señales de sobredosis



Respiración lenta

Respira muy lento, débil, jadea o no respira.




No despierta

Muy somnoliento, flácido o no responde.



Pupilas pequeñas

Pupilas muy pequeñas pueden indicar sobredosis.



Labios azulados

Labios, uñas o piel azul, gris o fría.



Posible fentanilo

Riesgo con pastillas falsas, heroína, cocaína, metanfetamina o drogas desconocidas.



Llame al 911

La naloxona es temporal. Necesita atención de emergencia.



Sonidos de ahogo

Ronquidos, gorgoteo o ahogo pueden indicar respiración bloqueada.



Piel fría/sudorosa

La piel puede estar fría, sudorosa o pegajosa.

¿Qué debe hacer?



VERDE - Prepárese

Tenga naloxona. No use solo. Evite pastillas desconocidas. Busque ayuda médica.



AMARILLO - Posible sobredosis

Si no está seguro, trátelo como sobredosis. Use naloxona y llame al 911.



ROJO - Llame al 911

No respira o respira lento, labios azules, no despierta o se desploma. Use naloxona.

Mayor riesgo:

Personas que usan opioides, pastillas falsas, drogas mezcladas, alcohol/benzodiacepinas o vuelven a usar tras una pausa.



ESCANEE PARA VIDEOS

Diga: "Posible sobredosis de opioides. Di naloxona."
SAMHSA: 1-800-662-HELP

¿Necesita ayuda? Llame al 911 para emergencias. Para recursos locales, marque 2-1-1.

Solo con fines educativos. Consulte siempre a un profesional de la salud.